


解禁となったトロール漁のワカサギの魚体情報について

7月21日に令和6年のワカサギ漁が解禁となりました。漁獲されたワカサギを測定した結果、霞ヶ浦では、体重は過去10年で最も小さく、体長、肥満度は下から2番目に、北浦では3項目ともに最も小さくなりました。詳細は下表をご参照ください。

表 ワカサギ測定結果

1 霞ヶ浦				
年	全長 (TL) [mm]	体長 (SL) [mm]	体重 [g]	肥満度
2014	65.4	55.8	2.0	11.6
2015	69.6	59.2	2.3	11.1
2016	70.1	59.8	2.4	11.3
2017	68.4	59.1	2.0	9.5
2018	67.3	56.8	2.0	10.8
2019	70.5	59.5	2.3	11.1
2020	68.2	57.5	1.9	10.1
2021	70.4	59.3	2.2	10.5
2022	61.9	52.2	1.4	9.4
2023	64.6	56.3	1.5	8.4
2024	62.0	53.1	1.3	8.5
平均値 (2014~2023)	67.6	57.5	2.0	10.4

2 北浦				
年	全長 (TL) [mm]	体長 (SL) [mm]	体重 [g]	肥満度
2014	64.3	54.3	1.7	10.9
2015	70.3	59.8	2.3	10.7
2016	72.6	61.7	2.6	10.9
2017	67.6	57.8	1.8	9.5
2018	68.4	57.9	2.0	10.2
2019	71.1	59.7	2.3	10.8
2020	67.6	57.0	1.8	9.6
2021	70.2	59.7	2.0	9.3
2022	65.8	55.5	1.5	8.8
2023	66.5	57.4	1.6	8.4
2024	63.9	54.9	1.3	7.6
平均値 (2014~2023)	68.4	58.1	2.0	9.9



- 1 全長 頭部前端から尾鰭末端まで
- 2 体長 吻端から尾鰭の付け根まで
- 3 体重 魚全体の重さ
- 4 肥満度 $(\text{魚体重}/(\text{魚体長})^3) \times 10^6$ で算出される太り具合