


# サバ類粗脂肪測定結果

水揚日 : 2017年5月16日  
 水揚港 : 銚子  
 漁場 : N 36°06'  
 E 140°55'

m マサバ  
 g ゴマサバ



No.	m/g	尾叉長 (cm)	体重 (g)	推定脂肪量 (%)
1	m	35.4	435.3	5
2	m	31.5	343.5	4
3	m	27.9	224.9	5
4	m	30.0	278.2	5
5	m	29.2	247.8	3
6	m	27.5	216.8	4
7	m	28.4	231.7	2
8	m	28.4	246.1	3
9	m	29.4	282.5	4
10	m	28.7	241.1	3
11	m	28.8	237.6	4
12	m	28.8	259.9	5
13	m	30.5	267.3	2
14	m	29.4	268.5	3
15	m	29.1	277.6	6
16	m	29.6	257.8	4
17	m	28.9	255.6	2
18	m	29.2	239.7	5
19	m	35.3	490.4	4
20	m	29.6	279.2	5
21	m	30.3	302.8	5
22	m	39.9	742.9	3
23	m	28.8	265.6	8
24	m	29.6	277.8	3
25	m	29.2	267.0	4
26	m	28.5	256.5	5
27	m	28.6	254.1	3
28	m	30.2	305.1	5
29	m	29.5	267.8	5
30	m	31.0	301.2	3

測定機器：近赤外分光器（FQA-NIRGUN） 静岡シブヤ精機(株)製  
 ※簡易測定法のため、実際の数値と±2%程度の誤差があります。

