


# サバ類粗脂肪測定結果

水揚日 : 2020年10月27日  
 水揚港 : 銚子  
 漁場 : N 35°47'  
 E 141°07'

m マサバ  
 g ゴマサバ



No.	m/g	尾叉長 (cm)	体重 (g)	推定脂肪量 (%)
1	m	28.1	233.6	8
2	m	26.0	188.4	6
3	m	28.1	250.3	12
4	m	27.4	220.7	8
5	m	28.0	230.2	5
6	m	26.4	181.7	7
7	m	26.2	180.7	5
8	m	27.9	236.3	10
9	m	28.5	210.6	4
10	m	28.4	221.7	4
11	m	29.2	271.6	8
12	m	26.6	197.5	7
13	m	28.8	235.4	5
14	m	25.6	176.1	6
15	m	29.4	255.0	5
16	m	27.1	204.7	5
17	m	29.1	244.1	7
18	m	27.5	210.4	9
19	m	27.2	213.2	8
20	m	27.3	228.2	10
21	m	27.9	218.9	5
22	m	26.6	218.4	11
23	m	27.2	214.2	7
24	m	28.4	256.3	13
25	m	29.4	276.6	8
26	m	26.1	203.1	9
27	m	27.0	212.6	9
28	m	27.3	203.6	6
29	m	26.9	202.2	5
30	m	26.7	187.6	7

測定機器：近赤外分光器（FQA-NIRGUN） 静岡シブヤ精機(株)製  
 ※簡易測定法のため、実際の数値と±2%程度の誤差があります。

